

1 Zugelassene Herbizide im Möhrenanbau für die Saison 2019 (Stand Februar 2019)

Präparat/Wirkstoff	Zulassung bis	Aufwandmenge Wartezeit	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt, Bemerkungen
AGIL-S Propaquizafop	30. 11. 2022 Zulassung	0,75 l/ha; max. 1x 30 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen bis 50 % Dickenwachstum (BBCH 11-45); Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen Schäden, einschl. Ertragsminderung möglich
Focus Ultra Cycloxydim	31. 12. 2025 gV*	2,5 l/ha; max. 1x 35 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (ab BBCH 11); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/ Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
	31. 12. 2025 gV*	5,0 l/ha; max. 1x 35 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (ab BBCH 11); Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm
Fusilade Max Fluazifop-P	31. 12. 2022 Zulassung	1,0 l/ha; max. 1x 49 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen; Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 1. Seiten- trieb/Bestockungstrieb sichtbar (BBCH 12-21)
Gallant Super Haloxypop-P	31. 12. 2022 Zulassung	0,5 l/ha; max. 1x 56 Tage	einkeimblättrige Unkräuter	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen; Frühjahr Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen
Targa Super Quizalofop-P	30. 11. 2020 Zulassung	1,25 l/ha; max. 1x 42 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/ Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
		2,0 l/ha; max. 1x 42 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: bei 15 bis 20 cm Unkrauthöhe
Targa Max Quizalofop-P	30. 11. 2020 Zulassung	0,6 l/ha; max. 1x 42 Tage	einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausg. Einjähriges Rispengras)	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: 2-Blatt-Stadium bis 9 oder mehr Seitentriebe/ Bestockungstriebe sichtbar (BBCH 12-29)
		1,25 l/ha; max. 1x 42 Tage	Gemeine Quecke	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen (BBCH 10-49); Stadium Unkraut: bei 15 bis 20 cm Unkrauthöhe
Roundup Rekord Glyphosat	31. 12. 2024 Zulassung	33%; max. 1x; max. Mit- telaufwand 5 kg/ha F	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; schwer bekämpfbare Unkräuter	während der Vegetationsperiode, streichen; zur gezielten Einzelpflanzenbehandlung
Roundup Power Flex Glyphosat	31. 12. 2022 gV*	3,75 l/ha; max. 1x F	ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Spritzen, Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung Stadium Kultur: bis zum Beginn des Dicken- wachstums (BBCH 41), Stadium Unkraut: nach dem Auflaufen
Bandur Aclonifen	31. 12. 2024 gV*	3,0 l/ha; max. 1x 90 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen; auch in Bundmöhren
		im Splittingverfahren, max. 2x; 1. Beh. 1,5 l/ha, 2. Beh. 1,0 l/ha 90 Tage		im Splitting: 1. Behandlung vor dem Auflaufen der Möhren, 2. Behandlung nach dem Auflaufen im 3-Blatt-Stadium (BBCH 13); auch in Bundmöhren
Centium 36 CS Clomazone	31. 12. 2025 Zulassung	0,25 l/ha; max. 1x F	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen bis 5 Tage nach der Saat (BBCH 00-09); Stadium Unkräuter: vor dem Auflaufen (BBCH 00-09)
Sencor Liquid Metribuzin	31. 12. 2022 gV*	0,3 l/ha; max. 1 x 42 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	nach dem Auflaufen, Stadium Kultur: 3 bis 4-Blatt-Stadium (BBCH 13-14)
		im Splittingverfahren, max. 2 x; 1. Beh. 0,1 l/ha, 2. Beh. 0,2 l/ha 42 Tage		im Splittingverfahren, 2 Behandlungen im Ab- stand von 7–14 Tagen, nach dem Auflaufen, Sta- dium Kultur: 2 bis 5-Blatt-Stadium (BBCH 12-15)
Stomp Aqua; Stomp Raps Pendimethalin	31. 12. 2019 gV*	im Splittingverfahren, 1,75 l/ha; max. 2x Abstand: 2-5 Wochen; 42 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut, Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-Arten, Kamille-Arten, Gemei- nes Kreuzkraut)	im Splitting: 1. Behandlung vor dem Auflaufen der Möhren, 2. Behandlung nach dem Auflau- fen im 2-3-Blatt-Stadium (BBCH 12-13) bis zum 1-Blatt-Stadium der Unkräuter
	31. 12. 2019 Zulassung	3,5 l/ha; max. 1x F	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausg. Kletten-Labkraut)	Stadium Kultur: vor dem Auflaufen Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich

In Niedersachsen nach einem Antrag auf einzelbetriebliche Genehmigung nach §22 möglich:

Betasana SC Phenmedipham	31. 7. 2019	3,0 l/ha; 2x 60 Tage	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Stadium Kultur: nach dem Auflaufen Stadium Unkraut: 1-3-Blatt-Stadium (BBCH 11-13), Abstand 7–10 Tage
------------------------------------	-------------	-------------------------	--	---

* gV = Zulassungserweiterung nach Art. 51 VO(EG) 1107/2009 für geringfügige Verwendung, das Anwendungsrisiko liegt beim Anwender.

Zusätzlich können in Möhren bis zwei Tage vor der Saat noch verschiedene Glyphosat-Präparate gegen bereits vorhandene Unkräuter eingesetzt werden.

Bei allen Pflanzenschutzmaßnahmen sind die aktuelle Zulassungssituation und die Gebrauchsanleitung genau zu beachten!